

University of Groningen

Prognostic Factors and Treatment of Endometrial carcinoma. A clinical and histopathological study

Aalders, Jan Gijsbert

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1982

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Aalders, J. G. (1982). *Prognostic Factors and Treatment of Endometrial carcinoma. A clinical and histopathological study*. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy


If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Stellingen

- 1 Bij patiënten met een adenocarcinoom van het endometrium stadium I dient de behandeling primair operatief te zijn.
- 2 Met gebruikmaking van bij operatie en histologisch onderzoek verkregen informatie over voor de prognose belangrijke factoren kan de noodzaak tot postoperatieve uitwendige bestraling bij het endometrium carcinoom stadium I aanzienlijk gereduceerd worden.
- 3 Een preoperatieve bestraling dient zo snel mogelijk door een operatie gevolgd te worden in verband met de verminderde barrière functie van de in het bestralingsveld gelegen lymfeklieren.
- 4 Antilichaam vorming tegen H.C.G. kan bij het vervolgen van een trofoblast woekering de bepaling van H.C.G. verstoren.
- 5 Subcutane continue insuline infusie verdient bij zwangere diabeticae voorkeur boven de conventionele behandeling met insuline injecties.
- 6 De tegenzin om een nauwkeurige staging te accepteren vertraagt de ontwikkeling van kennis en behandeling van het ovariumcarcinoom.
- 7 De vaginale bevalling is niet gecontraïndiceerd in aanwezigheid van een carcinoma in situ van de cervix uteri.
- 8 Alvorens cryocoagulatie toe te passen bij premaligne cervixafwijkingen dient het vriesletsel van de te gebruiken sondes door morfometrisch onderzoek vastgelegd te worden.
- 9 Met de toepassing van preventieve tandheelkundige maatregelen kan de jeugd in Nederland zich grotendeels verheugen op een beter gebit en een protheseloos leven.
- 10 De term "adjuvans chirurgie" zal bij de behandeling van kiemceltumoren een steeds duidelijker plaats gaan innemen.
- 11 Mature resttumoren na chemotherapie van gemetastaseerd non-seminoom van de testis zijn waarschijnlijk het resultaat van selectie van gedifferentieerde en differentiërende tumorcellen en niet van de novo inductie van differentiatie in embryonale carcinoomcellen door de chemotherapie.

Oosterhuis, J. W., Suurmeijer, A. J. H., Sleijfer, D. Th., Schraffordt-Koops, H., Oldhoff, J., Fleuren G. J. (1983). Effects of multiple drug chemotherapy (CIS-diamminedichloroplatinum, bleomycin and vinblastine) on the maturation of retroperitoneal lymph node metastases of non-seminomatous germ cell tumors of the testis: no evidence for de novo induction of differentiation. *Cancer* (in press).



-
- 12 Het “wekken van de foetus” in geval van een strak cardiotocogram is zinloos.
 - 13 Gelet op de procentuele toename van het aantal bejaarden in ons land wordt het hoog tijd om meer aandacht aan hun kwalen en ongemakken te besteden. Een consultatiebureau voor bejaarden zou een stap in de goede richting zijn.
 - 14 Bij de diagnostiek van maligne tumoren zal de “Nuclear Magnetic Resonance” (N.M.R.) een belangrijke aanwinst kunnen zijn.
 - 15 Er zijn onvoldoende argumenten om de opleiding tot gynaecoloog van 5 tot 6 jaar te verlengen.
 - 16 De toegepaste bezuiniging in het verticale vervoer in de Vrouwenkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen is een kostbare aangelegenheid gebleken.
 - 17 Een laatste stelling dient echt geestig te zijn.

STELLINGEN BEHORENDE BIJ
HET PROEFSCHRIFT VAN

JAN G. AALDERS

PROGNOSTIC FACTORS AND TREATMENT
OF ENDOMETRIAL CARCINOMA

GRONINGEN, 30 JUNI 1982